



Blutungen in der Schwangerschaft

Eine **Blutung in der Schwangerschaft** muss immer medizinisch abgeklärt werden. Suchen Sie bei aktiver, hellroter **Blutung** unverzüglich eine Klinik auf!

Bei unauffälligem medizinischen Befund, d.h. wenn Ihre Vitalfunktionen und die Ihres ungeborenen Kindes nicht gestört sind und es sich um eine tröpfelnde, passive und dunkle **Blutung in der Schwangerschaft** handelt, kann eine konservative, häusliche Behandlung durch die Hebamme einsetzen.

Blutungen am Beginn der Schwangerschaft

In der Frühschwangerschaft handelt es sich meist um harmlose **Blutungen**, da sich durch das enorme Wachstum der Gebärmuttermuskulatur kleine Schleimhautteilchen von der Innenwand ablösen. Aber auch nach dem Geschlechtsverkehr kann es in seltenen Fällen zu Kontaktblutungen am **Muttermund** kommen, die jedoch harmlos sind.

Autor: Ingeborg Stadelmann

Weitere Artikel, die Sie interessieren könnten:

- ▶ [Krampfadern in der Schwangerschaft](#)
- ▶ [Magnesium in der Schwangerschaft](#)
- ▶ [Myome in der Schwangerschaft](#)

[zum Artikel Blutungen in der Schwangerschaft](#)